

## Descripción del caso

<b>Especie</b>	Canino
<b>Raza</b>	Fox Terrier
<b>Edad</b>	12 años
<b>Sexo</b>	Hembra
<b>Médico Veterinario</b>	Wilder Cardona Arboleda
<b>Tipo de Lesión</b>	Mordedura producida por otro perro, contaminada a nivel del cuello, lado derecho.
<b>Característica de la lesión</b>	Lesión superficial, contaminada, de un diámetro de 10 cm, con material purulento.
<b>Evolución de la lesión</b>	El paciente se lleva a consulta al Médico Veterinario inmediatamente luego de la agresión por el perro, lo trata inicialmente con antibiótico, desinfección local y le coloca un collar isabelino para evitar autolesionarse. Luego de 8 días, el paciente llega a consulta (Médico Veterinario diferente al primer tratamiento), los propietarios manifiestan que la lesión antes de mejorar ha aumentado y que tiene mayor secreción y con mal olor, se establece un nuevo esquema de tratamiento, antibiótico (Cefalexina 20 mg/kg cada 8 horas), desinfección local con CICLORAC, 3 veces al día, previa limpieza de la lesión, por 8 días.

Registro Fotográfico

Día 1



Día 5



Disminución del olor  
y secreción de la herida

Día 15



Cicatrización casi total

Día 20



Cicatrización completa