



Agroganadera

DIURÉTICO

DIUREGAN®

Triclorometiazida 10 mg/mL - Dexametasona 0,5 mg/mL.

BENEFICIOS:

- ✓ Disminuye el edema mamario.
- ✓ Acelera y aumenta la eliminación de sustancias indeseables.
- ✓ Indicado también en edema postoperatorio en castraciones, acrobusitis y en afecciones edematosas en bovinos y equinos.
- ✓ Disminuye la inflamación.
- ✓ El animal retorna rápidamente a la producción.
- ✓ Disminuye la presentación de mastitis.

INDICACIONES:

Recomendado para el tratamiento del edema de la ubre en **vacas lecheras**.
Prevención de edema postoperatorio en castraciones y acrobusitis, afecciones edematosas en bovinos y equinos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Bovinos: Aplicar 20 mL de **DIUREGAN®** vía intramuscular profunda, repetir a las 12 horas y 36 horas después de iniciado el tratamiento. La duración del tratamiento depende del criterio del Médico Veterinario.

Equinos: 1 mL por 90 kg, dos veces el primer día y una dosis el segundo y tercer día.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.



PRESENTACIONES:

Frasco x 20 mL y
Frasco x 50 mL